



## Salud pública...

# “RESUMEN DE SITUACIÓN DE LA EPIDEMIA POR VIH/SIDA EN COLOMBIA 1983 - 2011”

Juan Carlos González\*\*\*



Libertad y Orden

Ministerio de Salud y Protección Social

República de Colombia

25 de mayo de 2012

[https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/observatorio\\_vih/documentos/monitoreo\\_evaluacion/1\\_vigilancia\\_salud\\_publica/a\\_situacion\\_epidemiologica/RESUMEN%20EPIDEMIA%20VIH%20FINAL%2021%20mayo\\_2012.pdf](https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/observatorio_vih/documentos/monitoreo_evaluacion/1_vigilancia_salud_publica/a_situacion_epidemiologica/RESUMEN%20EPIDEMIA%20VIH%20FINAL%2021%20mayo_2012.pdf)

Este es un resumen del documento publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social sobre la infección por VIH en Colombia desde el diagnóstico del primer caso hasta el 2011. Como siempre, invitamos a leer el artículo original. Entre los datos muy interesantes que mencionan resaltamos:



1. La infección por VIH está **concentrada** en tres grupos poblacionales:
  - 1.1. Hombres relacionados sexualmente con otros hombres (prevalencia algo más de 5 %).
  - 1.2. Trabajadoras sexuales (2,8 %).
  - 1.3. Población que usa drogas inyectables (algo más del 1 %).

\*\*\* MD MPS. Director Departamento de Medicina Comunitaria. FUJNC – [juan.gonzalez@juanncorpas.edu.co](mailto:juan.gonzalez@juanncorpas.edu.co)



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA  
JUAN N. CORPAS



2. **La prevalencia de infección por VIH** para el 2011 fue de 0,52 %.
  - 2.1. El número de casos reportados fue 129 630 casos de infección por VIH (y SIDA incluidos).
  - 2.2. La incidencia en el 2011 fue de 7 991 casos:
    - 2.2.1. Hombres: 5 685.
    - 2.2.2. Mujeres: 2 306.
  - 2.3. La proporción de hombres es de 71 % y de mujeres es de 29 % (razón de 2,4 hombres por 1 mujer).
  - 2.4. El 98 % de los casos son debidos a relaciones sexuales.
  - 2.5. La mortalidad por SIDA fue de 4,5 por 100 000:
    - 2.5.1. Quindío, Risaralda y el Valle fueron los sitios con mayor mortalidad.
  - 2.6. La prevalencia en mujeres embarazadas de seropositividad fue de 0,09 %.
    - 2.6.1. La transmisión vertical fue 4,9 % (2009).



[https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHuLUDB\\_M-tjvGewa1b-YOIeWdzNrxqQELVYOLKOieEyUSRmEYA](https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHuLUDB_M-tjvGewa1b-YOIeWdzNrxqQELVYOLKOieEyUSRmEYA)

3. La recopilación de casos desde 1983 hasta 2011 muestra:
  - 3.1. Infección por VIH 59 035 infectados.
  - 3.2. Pacientes con SIDA: 17 279.
  - 3.3. Fallecimientos: 10 676.
4. En cuanto a las regiones de mayor prevalencia:
  - 4.1. Barranquilla y Quindío tienen las tasas por 100 000 más altas con 33 y 32,9, respectivamente.
  - 4.2. La más baja, Vichada con 3,1 por 100 000.
  - 4.3. Amazonas, Bogotá, Cartagena, Córdoba, Norte de Santander y Valle, presentan una tasa entre 20 y 30 por 100 000.
  - 4.4. Tasas entre 10 y 20 por 100 000 están presentes en Antioquia, Caldas, Caquetá, Guaviare, Huila, Guajira, Magdalena, Meta, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés.
  - 4.5. Tasas menores de 10 por 100 000 se encuentran en Putumayo, Nariño, Guainía, Cundinamarca, Chocó, Cauca, Casanare, Boyacá, Bolívar y Arauca.

-----